Dove solo l'acqua non basta

BIOCLOR®

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
COMPRESSE EFFERVESCENTI DISINFETTANTI AD AZIONE BATTERICIDA
Pastiglia da gr. 3 – barattolo da 334 compresse

➢ **Composizione**

100 g. contengono:

- Sodio dicloroisocianurato g. 50
- Eccipienti q.b. a g. 100

Cloro disponibile: 28 g.

➢ **Caratteristiche chimico-fisiche**

- Compresse lisce angoli smussati, colore bianco e odore caratteristico di cloro
- PH in soluzione acquosa al 40% - 6,5

➢ **Meccanismo d'azione**

Il principio attivo di **BIOCLOR®** (Sodio dicloroisocianurato) libera in soluzione acquosa acido ipocloroso producendo una riduzione del numero di batteri

---

➢ **Spettro d'azione**

- Battericida nei confronti di STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCC 6538
- PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC 15442
- ENTEROCOCCUS HIRAE ATCC 10541
- ESCHERICHIA COLI ATCC 10536

Alla concentrazione 250 ppm di cloro attivo dopo 5 minuti di contatto. Secondo quanto previsto dal CEN pr EN 13697

➢ **Applicazioni**

- Industria alimentare:	Trattamento battericida di superfici di lavoro (bancali-vassoi-taglieri etc.), pavimenti, pareti, attrezzature utensili, macchinari.
- Ristorazione, bar, mense, comunità, case di cura, ospedali, nei locali pubblici:	Per il trattamento battericida dei pavimenti, pareti, superfici di vario tipo, piani di lavoro espositori, vassoi, stoviglieria, taglieri attrezzi ed utensili.
- Abitazioni:	In tutte le operazioni domestiche che richiedono un efficace trattamento battericida di superfici, pavimenti, piccoli suppellettili di uso personale (come forbici, limette,rasoi,spazzolini da denti) bagni, vasche e servizi igienici in genere ; lavaggio antisettico di frutta e verdura (risciacquare accuratamente prima dell'uso) stoviglieria del bambino, come biberon, tettarelle ed altro (anche in questo caso, risciacquare accuratamente prima dell'uso)

BIOCLOR®

COMPRESSE EFFERVESCENTI DISINFETTANTI AD AZIONE BATTERICIDA

- **Modalità d'uso**

  BIOCLOR® compresse deve essere disciolto in acqua. La concentrazione ottimale d'impiego corrisponde a 250 ppm di cloro, corrispondente per ogni grammo di prodotto ad una dissoluzione in 1 litro di acqua.
  Preparare la soluzione da utilizzare aggiungendo al volume scelto di acqua il corrispondente numero di compresse.
  A soluzione terminata assicurare un contatto di almeno 5 minuti tra la soluzione e le superfici, attrezzature, utensili, recipienti, serbatoi, tubazioni, suppellettili da trattare.

- **Indicazioni**

  1 compressa da 0,5 g. - in 1/2 litro d'acqua
  1 compressa da 1 g. - in 1 litro d'acqua
  1 compressa da 2 g. - in 2 litri d'acqua
  1 compressa da 3 g. - in 3 litri d'acqua
  1 compressa da 4 g. - in 4 litri d'acqua

- **Controllo qualità**

- Controlli sul prodotto finito
  Peso, aspetto, tempo di disaggregazione, durezza, titolo del principio attivo

- **Validità 36 mesi**

  Conservare il prodotto in luogo asciutto a temperatura ambiente

- **Misure di sicurezza**:

  Vedere scheda di sicurezza

SEPCA
Dove solo l'acqua non basta

Presidio Medico Chirurgico reg. Min. San. N. 18743